

Name:

Klasse/Jahrgang:

Kompensationsprüfung  
zur standardisierten kompetenzorientierten  
schriftlichen Reife- und Diplomprüfung bzw.  
zur standardisierten kompetenzorientierten  
schriftlichen Berufsreifeprüfung

Jänner 2025

# Angewandte Mathematik (BHS)

## Berufsreifeprüfung Mathematik

Kompensationsprüfung 1  
Angabe für **Kandidatinnen/Kandidaten**

# Hinweise zur Kompensationsprüfung

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat!

Die vorliegende Angabe zur Kompensationsprüfung umfasst vier Aufgaben, die unabhängig voneinander bearbeitbar sind.

Jede Aufgabe umfasst drei nachzuweisende Handlungskompetenzen.

Die Vorbereitungszeit beträgt mindestens 30 Minuten, die Prüfungszeit maximal 25 Minuten.

Die Verwendung der vom zuständigen Regierungsmitglied für die Klausurarbeit freigegebenen Formelsammlung für die SRDP in Angewandter Mathematik ist erlaubt. Weiters ist die Verwendung von elektronischen Hilfsmitteln (z. B. grafikfähiger Taschenrechner oder andere entsprechende Technologie) erlaubt, sofern keine Kommunikationsmöglichkeit (z. B. via Internet, Intranet, Bluetooth, Mobilfunknetzwerke etc.) gegeben ist und der Zugriff auf Eigendateien im elektronischen Hilfsmittel nicht möglich ist.

## Beurteilung

Jede Aufgabe wird mit null, einem, zwei oder drei Punkten bewertet. Insgesamt können maximal zwölf Punkte erreicht werden.

## Beurteilungsschlüssel für die Kompensationsprüfung

| Gesamtanzahl der nachgewiesenen Handlungskompetenzen | Beurteilung der mündlichen Kompensationsprüfung |
|--|---|
| 12   | Sehr gut  |
| 10–11  | Gut   |
| 8–9  | Befriedigend                                    |
| 6–7  | Genügend  |
| 0–5  | Nicht genügend                                  |

Viel Erfolg!

# Aufgabe 1


## Autorennen

- a) Auf der Rennstrecke *Laguna Seca* in Kalifornien gibt es einen Streckenabschnitt namens *Corkscrew*, der auf dem steilsten Stück ein Gefälle von 11 % aufweist.

- 1) Berechnen Sie den zu diesem Gefälle gehörigen Winkel.

Ein bestimmter Streckenabschnitt setzt sich aus einem geradlinigen Teil und einem Kreisbogen zusammen.

Dieser Streckenabschnitt mit der Länge  $\ell$  ist in der nachstehenden Abbildung (Ansicht von oben) fett markiert.



- 2) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung von  $\ell$  auf. Verwenden Sie dabei  $\alpha$ ,  $a$  und  $r$ .

$$\ell = \underline{\hspace{10cm}}$$

- b) Ein anderer Streckenabschnitt mit der Länge  $s$  wird mit der konstanten Geschwindigkeit  $v$  in der Zeit  $t$  durchfahren.

Maria behauptet: „Wird auf diesem Streckenabschnitt die konstante Geschwindigkeit  $v$  um 30 % erhöht, so verringert sich die Zeit  $t$  um 30 %.“


- 1) Zeigen Sie, dass Marias Behauptung falsch ist.

## Aufgabe 2

### Wasserkanal


- a) Ein Bach soll reguliert werden. Dafür wird ein Wasserkanal angelegt.

Der Querschnitt eines bestimmten Abschnitts des Wasserkanals wird durch den Graphen der quadratischen Funktion  $f$  beschrieben (siehe nachstehende Abbildung).



- 1) Stellen Sie eine Gleichung der quadratischen Funktion  $f$  auf.


- b) Der Querschnitt eines anderen Abschnitts des Wasserkanals wird durch den Graphen der quadratischen Funktion  $g$  beschrieben. Dieser Abschnitt hat eine Länge von 30 m. (Siehe nachstehende Abbildungen.)



Es gilt:  $g(x) = \frac{4}{25} \cdot x^2 + \frac{4}{25} \cdot x + \frac{1}{25}$

- 1) Berechnen Sie, wie viele Kubikmeter Wasser sich in diesem Abschnitt des Wasserkanals befinden.

c) In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der Polynomfunktion  $h$  dargestellt.



- 1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Für die Polynomfunktion  $h$  im Intervall  $[1; 4]$  gilt: \_\_\_\_\_ ① \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_.

| ①           |                          |
|-------------|--------------------------|
| $h'(x) < 0$ | <input type="checkbox"/> |
| $h'(x) = 0$ | <input type="checkbox"/> |
| $h'(x) > 0$ | <input type="checkbox"/> |

| ②            |                          |
|--------------|--------------------------|
| $h''(x) < 0$ | <input type="checkbox"/> |
| $h''(x) = 0$ | <input type="checkbox"/> |
| $h''(x) > 0$ | <input type="checkbox"/> |

## Aufgabe 3

### Waren- und Güterverkehr

- a) Die Menge der pro Jahr auf einer bestimmten Bahnstrecke transportierten Güter in Abhängigkeit von der Zeit kann durch die lineare Funktion  $g$  modelliert werden.

$t$  ... Zeit in Jahren mit  $t = 0$  für das Jahr 2017

$g(t)$  ... Menge der pro Jahr transportierten Güter zur Zeit  $t$  in Tonnen

Die jeweilige Menge der pro Jahr transportierten Güter ist für zwei ausgewählte Jahre in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| Jahr | Menge der pro Jahr transportierten Güter in Tonnen |
|------|--|
| 2017 | 50 000   |
| 2021 | 135 000  |

- 1) Berechnen Sie mithilfe der Funktion  $g$  die Menge der pro Jahr transportierten Güter für das Jahr 2026.

In einem anderen Modell wird die Menge der pro Jahr transportierten Güter in Abhängigkeit von der Zeit durch die Exponentialfunktion  $f$  beschrieben.

$$f(t) = 50\,000 \cdot 1,282^t$$

$t$  ... Zeit in Jahren mit  $t = 0$  für das Jahr 2017

$f(t)$  ... Menge der pro Jahr transportierten Güter zur Zeit  $t$  in Tonnen

Die Funktion  $f$  soll in der Form  $f(t) = b \cdot e^{k \cdot t}$  dargestellt werden.

- 2) Tragen Sie die fehlenden Zahlen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

$$f(t) = \boxed{\phantom{000}} \cdot e^{\boxed{\phantom{000}} \cdot t}$$

- b) Die Anzahl der Pakete, die im Jahr 2022 in einem bestimmten Verteilzentrum pro Tag abgefertigt worden sind, lässt sich durch die Funktion  $p$  modellieren.

$t$  ... Zeit in Tagen mit  $t = 0$  für den Beginn des Jahres 2022

$p(t)$  ... Anzahl der pro Tag abgefertigten Pakete zur Zeit  $t$

- 1) Interpretieren Sie das Ergebnis der nachstehenden Berechnung im gegebenen Sachzusammenhang.

$$\int_0^{365} p(t) \, dt = 475\,000$$

## Aufgabe 4

### Medizinischer Test

Bei einem bestimmten medizinischen Test werden zum Nachweis einer Krankheit Blutproben untersucht.

- a) Aus Erfahrung weiß man, dass bei solch einem Test jede Blutprobe unabhängig von den anderen Blutproben mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % ein positives Testergebnis liefert.

Es wird eine Zufallsstichprobe von 120 Blutproben untersucht.

- 1) Interpretieren Sie das Ergebnis der nachstehenden Berechnung im gegebenen Sachzusammenhang.

$$120 \cdot 0,1 = 12$$

Es wird eine Zufallsstichprobe von 30 Blutproben untersucht.

- 2) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen 30 Blutproben keine einzige ein positives Testergebnis liefert.

- b) Nicht jede Blutprobe ist auswertbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Blutprobe auswertbar ist, beträgt unabhängig von den anderen Blutproben  $p$ .

Es wird eine Zufallsstichprobe von 50 Blutproben untersucht.

- 1) Stellen Sie mithilfe von  $p$  eine Formel zur Berechnung der nachstehenden Wahrscheinlichkeit auf.

$$P(\text{„mindestens 49 von 50 Blutproben sind auswertbar“}) = \underline{\hspace{10cm}}$$