

Name:

Klasse/Jahrgang:

Kompensationsprüfung  
zur standardisierten kompetenzorientierten  
schriftlichen Reife- und Diplomprüfung bzw.  
zur standardisierten kompetenzorientierten  
schriftlichen Berufsreifeprüfung

Juni 2024

# Angewandte Mathematik (BHS)

## Berufsreifeprüfung Mathematik

Kompensationsprüfung 4  
Angabe für **Kandidatinnen/Kandidaten**

# Hinweise zur Kompensationsprüfung

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat!

Die vorliegende Angabe zur Kompensationsprüfung umfasst vier Aufgaben, die unabhängig voneinander bearbeitbar sind.

Jede Aufgabe umfasst drei nachzuweisende Handlungskompetenzen.

Die Vorbereitungszeit beträgt mindestens 30 Minuten, die Prüfungszeit maximal 25 Minuten.

Die Verwendung der vom zuständigen Regierungsmitglied für die Klausurarbeit freigegebenen Formelsammlung für die SRDP in Angewandter Mathematik ist erlaubt. Weiters ist die Verwendung von elektronischen Hilfsmitteln (z. B. grafikfähiger Taschenrechner oder andere entsprechende Technologie) erlaubt, sofern keine Kommunikationsmöglichkeit (z. B. via Internet, Intranet, Bluetooth, Mobilfunknetzwerke etc.) gegeben ist und der Zugriff auf Eigendateien im elektronischen Hilfsmittel nicht möglich ist.

## Beurteilung

Jede Aufgabe wird mit null, einem, zwei oder drei Punkten bewertet. Insgesamt können maximal zwölf Punkte erreicht werden.

## Beurteilungsschlüssel für die Kompensationsprüfung

Gesamtanzahl der nachgewiesenen Handlungskompetenzen	Beurteilung der mündlichen Kompensationsprüfung
12	Sehr gut
10–11	Gut
8–9	Befriedigend
6–7	Genügend
0–5	Nicht genügend


Viel Erfolg!

# Aufgabe 1

## Windrose

Mithilfe von Windrosen werden Himmelsrichtungen angegeben. Häufig verwendet man Windrosen auch zur Orientierung auf Landkarten.


a) In der nachstehenden Abbildung ist eine Windrose dargestellt.



- 1) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung eine Strecke ein, deren Länge mit dem nachstehenden Ausdruck berechnet werden kann.

$$x \cdot \sin(\alpha)$$

b) In der nachstehenden Abbildung ist eine vereinfachte Windrose dargestellt, die aus acht deckungsgleichen Dreiecken besteht.




- 1) Berechnen Sie den Flächeninhalt dieser Windrose.  
2) Stellen Sie mithilfe von  $\alpha$  eine Formel zur Berechnung von  $\beta$  auf.

$$\beta = \underline{\hspace{5cm}}$$

## Aufgabe 2

### Wandspiegel

In der nachstehenden Abbildung ist ein Wandspiegel in der Ansicht von vorne modellhaft in einem Koordinatensystem dargestellt.



- a) Die obere Begrenzungslinie des Glases kann durch den Graphen der Funktion  $f$  modelliert werden.

$$f(x) = -0,00625 \cdot x^2 + 100$$

$x, f(x)$  ... Koordinaten in cm

- 1) Berechnen Sie den Flächeninhalt der in der obigen Abbildung grau markierten Fläche.

- b) Die obere Begrenzungslinie des Lichtbands kann durch den Graphen der Funktion  $g$  modelliert werden.

Der Graph von  $g$  liegt an jeder Stelle 10 cm über dem Graphen von  $f$ .

- 1) Tragen Sie in der nachstehenden Gleichung der Funktion  $g$  die fehlenden Zahlen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

$$g(x) = \boxed{\phantom{000}} \cdot x^2 + \boxed{\phantom{000}}$$

Der Punkt  $P$  in der obigen Abbildung hat die  $x$ -Koordinate  $x_P$ .

- 2) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung den Winkel  $\alpha$  ein, der mit dem nachstehenden Ausdruck berechnet werden kann.

$$\alpha = 90^\circ + \arctan(g'(x_P))$$

## Aufgabe 3

### Wölfe in Österreich

Eine Wildtierbiologin untersucht die Anzahl der Wölfe in verschiedenen Regionen Österreichs.

a) Für die Region A stellt sie folgende Behauptung auf:

„Die Anzahl der Wölfe nimmt aktuell sehr stark zu, und zwar mit einem exponentiellen Wachstum von rund 33 % pro Jahr, was eine Verdopplung in 3 Jahren bedeutet.“

1) Zeigen Sie, dass diese Behauptung zur Verdoppelungszeit unter der Annahme eines exponentiellen Wachstums mit einem jährlichen Änderungsfaktor von 1,33 nicht stimmt.

b) Für die Region B modelliert die Wildtierbiologin die Anzahl der Wölfe mithilfe der Funktion  $w$ .

$$w(t) = 31 \cdot e^{0,285 \cdot t}$$

$t$  ... Zeit in Jahren mit  $t = 0$  für den Beginn des Jahres 2022

$w(t)$  ... Anzahl der Wölfe zum Zeitpunkt  $t$

1) Berechnen Sie die absolute Änderung der Anzahl der Wölfe in dieser Region vom Beginn des Jahres 2022 bis zum Beginn des Jahres 2027.

c) Für die Region C modelliert die Wildtierbiologin die Anzahl der Wölfe mithilfe der Funktion  $u$ .

$t$  ... Zeit in Jahren

$u(t)$  ... Anzahl der Wölfe zum Zeitpunkt  $t$

Die mittlere Änderungsrate der Anzahl der Wölfe im Zeitintervall  $[0; 3]$  ist um 25 % kleiner als die mittlere Änderungsrate der Anzahl der Wölfe im Zeitintervall  $[3; 7]$ .

1) Stellen Sie mithilfe der Funktion  $u$  eine Gleichung zur Beschreibung dieses Sachverhalts auf.

## Aufgabe 4

### Apfelsaft

- a) Wird Apfelsaft hergestellt, werden zuerst mangelhafte Äpfel aussortiert. Erfahrungsgemäß ist 1 % der Äpfel einer bestimmten Apfelsorte mangelhaft. Im Rahmen einer Qualitätsprüfung wird eine Zufallsstichprobe von  $n$  Äpfeln dieser Apfelsorte entnommen ( $n > 2$ ).

- 1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass \_\_\_\_\_ ① \_\_\_\_\_ 2 Äpfel mangelhaft sind, kann mit dem Ausdruck \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_ berechnet werden.

①		②	
mindestens	<input type="checkbox"/>	$0,99^2 \cdot 0,01^{n-2}$	<input type="checkbox"/>
höchstens	<input type="checkbox"/>	$0,99^n + n \cdot 0,01 \cdot 0,99^{n-1}$	<input type="checkbox"/>
genau	<input type="checkbox"/>	$1 - 0,99^n - n \cdot 0,01 \cdot 0,99^{n-1}$	<input type="checkbox"/>


- b) Ein Unternehmen füllt Apfelsaft in Flaschen ab. Das Füllvolumen einer Flasche wird durch die normalverteilte Zufallsvariable  $X$  mit dem Erwartungswert  $\mu = 1\,000$  ml und der Standardabweichung  $\sigma = 6$  ml modelliert.

Eine befüllte Flasche wird genau dann aussortiert, wenn ihr Füllvolumen um mehr als 15 ml vom Erwartungswert abweicht.

- 1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine befüllte Flasche aussortiert wird.

- c) Das Füllvolumen von Flaschen, die mit Apfelsaft befüllt worden sind, wird gemessen. Folgende Daten sind bekannt:

Minimum	987 ml
Spannweite	28 ml
1. Quartil	996 ml
Interquartilsabstand	9 ml
Median	1 000 ml



- 1) Zeichnen Sie im obigen Diagramm den zugehörigen Boxplot ein.